

PASHTO

د استعمال لپاره لارښوونې

تاسې ته ايزي هيلر درکړل شوی دی

دا کتابکوتی د هغه کسانو لپاره دی چې د نفس تنگی یا د سږو د زړې ناروغی (COPD) د تداوي لپاره ورته ايزي هيلر لیکل شوی دی.

ايزي هيلر څه شی دی؟


ايزي هيلر د نفس تنگی یا د سږو د زړې ناروغی د تداوي لپاره يو پياوړی انهيډر دی. دا په استعمال کې اسان دی او کوم پروفیلنټ یا د سون ماده په کې نه ده شامل کړی شوی. تاسې انهيډر په خولې کې په ايښودلو پاور د ساه په ذريعه خپل سږو ته رسوئ. ايزي هيلر د خوراکی مقدار شمېرونکی لري چې په څرگند ډول دا ښايي چې څومره مقدار پاتې شو. ايزي هيلر د تداوي د پنځوو انتخابونو سره راځي



د ساتنې پوښ
تاسې ايزي هيلر د ساتنې د پوښ سره او بې له دې استعمالولی شئ. کله چې تاسې ساده دننه راکاږئ، انهيډر په پوښ کې پاتې کېدی شي.



د خولې ساتونکی
(د دورې د مخنيوي سر)
دا ډاډمنه کوئ چې ساتونکی (د دورې د مخنيوي سر) د انهيډر د خولې له پټوي. دغه سر انهيډر د فعاله کېدو څخه ساتي.




انهيلر
د خولې له

په ايزي هيلر سره به څنگه مقدار برابرئ او استعمالوئ

دا مهمه ده چې لاندې لارښوونې په غور سره وگورئ.

۱- لړزول

- ساتونکی (د دورې د مخنيوي سر) د خولې له الې څخه لري کړئ.
- که د ساتنې پوښ په پیک کې موجود وي، تاسې خپل ايزي هيلر په دغه پوښ کې دننه کولی شئ.
- په نېغ نېولو سره يو څو ځله انهيډر ولړزوئ.



۲- کلېک کړئ

- ايزي هيلر په خپلو گوتو کې نېغ ونیسئ او کله چې کلېک واورئ نو يو ځل بې پریس کړئ. دا پریږدئ چې خپل اصلي پوزسيون ته واپس راشي، په بله معنی (واپس کلېک کړئ).
- اوس د درملو مقدار د ساه له لارې د راکاږلو لپاره چمتو دی.



۳- ساه دننه راکاږئ

- عادي ساه اخلئ.
- د خولې بشپړه اله په خوله کې کيږدئ او د الې چاپېره شونډې ولگوئ چې ښه بندول يقيني شي. د انهيډر له لارې ژور ساه واخلئ.
- د خپلې خولې څخه د خولې د غه اله لري کړئ او د ۵ ثانیو پورې ساه ونیسئ، بیا په عادي توګه ساه واخلئ. کله چې په خوله کې لږ شان خور خوند محسوس کړئ، نو تاسې په دې ډاډمن کېدی شئ چې مقدار مو واخيستلو.



- که تاسې ته له يو څخه زيات مقدار ونه لیکل شوی وي، د ۱ ګام څخه بیا تکرار کړئ.
- که تاسې Beclomet، Salfumix، Bufomix یا Giona ايزي هيلر استعمال کړی وي، نو هميشه د خوراک اخيستلو وروسته خپل خوله کنګالوئ او په اوبو غرغره کوئ. اوبه توکئ.
- ساتونکی (د دورې د مخنيوي سر) واپس د خولې په اله کېږدئ. د ساتنې پوښ بند کړئ، که تاسې بې استعمالولی.
- که تاسې په غير ارادي توګه ايزي هيلر کلېک کړو، داسې چې خوراک مو د ساه له لارې نه وي اخيستلی، نو دا په دې طريقه خالي کړئ د خولې له د خپل لاس يا ميز سره په کراره ووهئ.

کله چې انهيډر خالي وي، ما ته به څنگه معلومېږي؟

ايزي هيلر د خوراکی مقدار شمېرونکی لري چې په څرگند ډول دا ښايي چې څومره مقدار پاتې شو. دا د خوراک هر پنځم مقدار شمېري او د ۱۰ خوراګونو وروسته شمېری بنډل کيږي. کله چې د سور پس منظر سره شمېری ښکاره شي، نو ۲۰ خوراګونه پاتې وي. کله چې شمېرونکی ۰ ته ورسې، نو انهيډر بدل کړئ، که څه هم تاسې به اوس هم د انهيډر د شا په ونډو کې پاور وینئ.



د ايزي هېلر ساتنه او ايښودنه

Buformix ايزي هېلر د ۴ مياشتو پورې وروسته له هغې ساتلې شې کله چې پلاستيکي کڅوړه پرانيستل شي. **Salfumix** ۵۰/۲۵۰ مایکروگرامز د ۱ مياشتې پورې ساتلې شې او ۵۰/۵۰۰ مایکروگرامز د ۲ مياشتو پورې ساتلې شې. **Buformix**، **Giona** او **Beclomet** ايزي هېلر د ۶ مياشتو پورې ساتلې شې. ايزي هېلر بايد په وچ ځای کې د خونې په تودوخه کې وساتل شي. دا د پوښ سره او بي له پوښه موجود وي. پوښ د انهيډر د اضافي خونديتوب لپاره استعماليدی شي (د نورو معلوماتو لپاره د پيکچ کتابگوټې وگورئ).

د برانکوډايلېټر تداوی اسانول


BUVENTOL ايزي هېلر



په **Buventol** ايزي هېلر کې سلبوتامال شامل وي چې برونش پراخوي او ساه اخيستل اسانوي. دا په چټکۍ سره کار کوي او د نفس تنگی علامات بڼه کوي يا د سږو په مزمن ناروغۍ کې ساه اخيستل اسانوي. دا يو څو دقيقو کې اثر کوي او شاوخوا تر ۴-۶ ساعتو پورې کار کوي. ايزي هېلر په دوو مقدارونو کې موجود دي، ۱۰ مایکروگرامز/مقدار او ۲۰۰ مایکروگرامز/مقدار.

د مخنيوي/التهابي ناروغۍ تداوی:

GIONA ايزي هېلر او BECLOMET ايزي هېلر



په **Giona** ايزي هېلر کې بیدسونایډ او **Beclomet** ايزي هېلر کې بکلوميټاسون شامل وي. دواړه د درملو د هغه گروپ څخه تعلق لري چې کارټي کوسټیرایډ ورته ويل کيږي او په نفس تنگی کې د دوام د معالجي او احتیاطي تداوي لپاره استعمالیږي. **Giona** ايزي هېلر او **Beclomet** ايزي هېلر په برونش کې د التهاب مخنیوی کوي او دا کموي او د نفس تنگی د علاماتو څخه د مخنیوي لپاره بايد په دوامداره توگه استعمال کرل شي، په بله معنی، که تاسې علامات نه هم لرئ نو د هغې پشمول. پو يو څو ورځو کې د دې اثر څرگنديږي او پوره تاثیر د يو څو اونۍ د تداوي وروسته ترلاسه کيږي. **Giona** ايزي هېلر په درې خوراکی مقدارونو کې راځي، د ۱۰۰ مایکروگرامز/مقدار، د ۲۰۰ مایکروگرامز/مقدار، د ۴۰۰ مایکروگرامز/مقدار. **Beclomet** ايزي هېلر د ۲۰۰ مایکروگرامز/مقدار کې راځي.

مخنیوی کول/تداوی اسانول:

BUFOMIX ايزي هېلر



په **Buformix** ايزي هېلر کې دوه بیلایډل درمل شامل وي: بیودیسونایډ او فرموترال. بیودیسونایډ د درملو د هغه گروپ سره تعلق لري چې کارټي کوسټیرایډ ورته ويل کيږي او د دوام د معالجي لپاره استعمالیږي. دا په سږو کې پړسوب او التهاب کموي او د هغې مخنیوی کوي. فرموترال برونش پراخوي او ساه اخيستل اسانوي. د فرموترال اثر په ۱-۳ دقیقو کې پیل کيږي، وروسته له هغه چې د ساه په ذریعه واخیستل شي او د يو خوراک وروسته اوسطاً تر ۱۲ ساعتو پورې کار کوي. **Buformix** ايزي هېلر د بیودیسونایډ / فرموترال په دريو خوراکی مقدارونو کې راځي: ۸۰ / ۴/۵ مایکروگرامز، ۱۶۰ / ۴/۵ مایکروگرامز او ۳۲۰ / ۹ مایکروگرامز.

احتیاطي تداوی:

SALFLUMIX ايزي هېلر



په **Salfumix** ايزي هېلر کې دوه مختلف درمل شامل وي: سلمیټرال او **fluticasone propionate**. سلمیټرال او **fluticasone propionate** د درملو د هغه گروپ سره تعلق لري کوم ته چې کارټي کوسټیرایډ ويل کيږي او د احتیاط او مخنیوي لپاره استعمالیږي. دا په سږو کې پړسوب او التهاب کموي او د هغې مخنیوی کوي. سلمیټرال برونش پراخوي او ساه اخيستل اسانوي. د سلمیټرال اثر په ۱-۳ دقیقو کې پیل کيږي، وروسته له هغه چې د ساه په ذریعه واخیستل شي او د يو خوراک وروسته اوسطاً تر ۱۲ ساعتو پورې کار کوي. **Salfumix** ايزي هېلر د سلمیټرال/ **fluticasone propionate** په دوو مختلف خوراکی مقدارو کې راځي: ۵۰/۲۵۰ مایکروگرامز او ۵۰/۵۰۰ مایکروگرامز.

همیشه په هغه طبي نسخه عمل کوئ چې تاسې ته درکول کيږي. د پيکچ کتابگوټې په احتیاط سره وگورئ. که تاسې کومې پوښتنې لرئ يا د خپل تداوي په اړه څه معلوماتو ته اړتیا لرئ، د خپل ډاکټر يا نرس سره خبرې وکړئ. د نورو معلوماتو لپاره دا ویب پاڼه وگورئ: www.fass.se for the public. د کورني فضلې موادو سره هېڅکله هم درمل مه غورځوئ. چاپیریال ته پام کوئ. پاتې شوي درمل فارمیسي ته ورکولی شئ.

Buventol Easyhaler (salbutamol) Pharmaceutical form: Inhalation powder **Active substance:** salbutamol. **Areas of use:** Buventol Easyhaler is an inhaler that contains the active substance salbutamol. Salbutamol works by opening up the airways and making it easier to breathe. Buventol Easyhaler is used for symptomatic relief of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Buventol Easyhaler is used in adults and children aged 6 years and over. **Warnings and precautions:** Talk to your doctor before using Buventol Easyhaler if you have or have had any of the following conditions: cardiovascular disease, angina, increased thyroid function, diabetes, low levels of potassium in the blood (hypokalaemia). If you have low levels of potassium in the blood (hypokalaemia), this condition can worsen if Buventol Easyhaler is used with diuretics, steroids, or certain other asthma medicines (xanthine derivatives). In such cases, talk to your doctor for advice. Contact your doctor if your asthma worsens or if the Buventol Easyhaler becomes less effective. If repeated inhalations are not effective in severe asthma attacks, other treatment is needed. If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before using this medicine. No adverse effects on the foetus have been demonstrated when using Buventol Easyhaler during pregnancy. It is unknown whether salbutamol passes into breast milk. You should therefore talk to your doctor before use during breast-feeding. **Giona Easyhaler (budesonide) Pharmaceutical form:** Inhalation powder **Active substance:** budesonide. **Areas of use:** Giona Easyhaler is a medicine that is used to prevent symptoms of asthma. Budesonide works by reducing and preventing swelling and inflammation of the lungs. **Warnings and precautions:** Talk to your doctor before using Giona Easyhaler if you have pulmonary tuberculosis, untreated bacterial, viral, or fungal infections of the mouth, respiratory tract, or lungs, or if you have severe liver disease. Contact your doctor if you experience blurred vision or other visual disturbances. Rinse your mouth after inhaling your dose to avoid fungal infection of the mouth. Giona Easyhaler is not recommended for children under 6 years. If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before using this medicine. It is important for both the foetus and the mother to maintain adequate asthma control during pregnancy. As with other medicines given during pregnancy, the benefits of budesonide treatment for the mother should be weighed against the risks to the foetus. The lowest effective dose of budesonide needed to maintain adequate asthma control should be used. **Beclomet Easyhaler (beclomethasone) Pharmaceutical form:** Inhalation powder **Active substance:** beclomethasone. **Areas of use:** Beclomet Easyhaler is a cortisone (corticosteroid) preparation that alleviates inflammation of the lungs. By treating the inflammation, you can prevent asthma symptoms. **Warnings and precautions:** Contact your doctor if you feel that the Beclomet Easyhaler is becoming less effective, for example if you have more frequent asthma attacks. Your drug treatment may need to be changed. You may experience cold symptoms, eczema, fatigue, headaches, muscle and joint pain, and nausea and vomiting may also occur. If you have a respiratory infection, if you have tuberculosis, or if you have to increase the use of other asthma medication. Talk to your doctor if you experience any of these conditions. Talk to your doctor if you experience constriction or spasms in the airways after using Beclomet Easyhaler. Talk to your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant. Your doctor will decide whether you should continue your treatment. Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine. **Buformix Easyhaler (budesonide/formoterol) Pharmaceutical form:** Inhalation powder **Active substance:** budesonide/formoterol. **Areas of use:** Buformix Easyhaler is a medicine for the treatment of asthma in adults and adolescents aged 12-17 years. It is also used to treat the symptoms of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) in adults aged 18 years and older. **Warnings and precautions:** Talk to your doctor or pharmacist before using Buformix Easyhaler if you have diabetes, a lung infection, high blood pressure, or if you have ever had heart problems (including an uneven heartbeat, very rapid pulse, narrowing of the arteries, or heart failure), problems with your thyroid or adrenal glands, low levels of potassium in the blood, or severe liver problems. Contact your doctor if you experience blurred vision or other visual disturbances. Rinse your mouth after inhaling your dose to avoid fungal infection of the mouth. If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before using this medicine. Do not use Buformix Easyhaler unless your doctor advises you to do so. If you become pregnant while using Buformix Easyhaler, do not stop using Buformix Easyhaler, but contact your doctor immediately. **Salfumix Easyhaler (salmeterol/fluticasone propionate) Pharmaceutical form:** Inhalation powder **Active substance:** salmeterol/fluticasone propionate. **Areas of use:** Your doctor has prescribed Salfumix Easyhaler to prevent breathing problems in Asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Salfumix Easyhaler (500 micrograms/500 micrograms per dose) reduces the number of flare-ups of COPD. You must use your Salfumix Easyhaler every day as directed by your doctor for it to work best and control your asthma or COPD. Salfumix Easyhaler prevents breathing problems and wheezing. However, Salfumix Easyhaler should not be used to relieve a sudden onset of shortness of breath or wheezing. If this happens, use a fast-acting 'on demand' inhaler, such as salbutamol. Keep your fast-acting inhaler with you at all times. **Warnings and precautions:** Talk to your doctor before using Salfumix Easyhaler if you have: Heart disease including rapid and irregular heartbeat, increased thyroid function, high blood pressure, diabetes (since Salfumix Easyhaler may increase your blood sugar), decreased blood levels of potassium in the blood, or if you have had tuberculosis (TB), or other infections of the lungs. Contact your doctor if you experience blurred vision or other visual disturbances. If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant, or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before using this medicine. **Responsible company:** Orion Pharma AB, www.orionpharma.se **Always read the package insert carefully**